

Caractéristiques cliniques et parcours de soins après un premier épisode psychotique : une étude rétrospective.

R. Bordas⁽¹⁾, L. Lamary⁽²⁾, C. Jourdan⁽²⁾, M. Pujol⁽³⁾, C. Basso⁽³⁾, E. Laffont⁽³⁾

⁽¹⁾Psychiatre, ⁽²⁾ Psychologue, ⁽³⁾ Infirmier CENTRE HOSPITALIER ARIÈGE COUSERANS BP 60111 09201 SAINT GIRONS CEDEX

CONTEXTE Les troubles schizophréniques

Dans le monde :
- 0,5 à 1% de la population ⁽¹⁾

En France :
- environ 635 000 cas ⁽²⁾
- 10.000 nouveaux cas par an⁽¹⁾

En Ariège (09) :
Aucune étude à notre connaissance n'explore le premier épisode psychotique, le parcours des patients en péri-hospitalisation, leurs caractéristiques cliniques et les facteurs de risque environnementaux de psychose associés.




QUESTION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS

Notre étude concerne des personnes souffrant de **Troubles du Spectre Schizophrénique (TSS)** ayant été hospitalisées au moins une fois ces six dernières années. Quels liens existent entre la trajectoire de soins, les caractéristiques cliniques et sociales avant, pendant et deux ans après leur première hospitalisation au CHAC ?


- Améliorer notre connaissance des parcours de soins avant la première hospitalisation et deux ans après.
- Affiner les prises en charge et projets de soins en tenant compte des spécificités de notre territoire.

POPULATION



*Hospitalisations hors département 09, suivis pédopsychiatrie, dossiers inaccessibles

UNE MÉTHODE RÉTROSPECTIVE



Formulaire de recueil répliqué aux quatre temps


- Caractéristiques sociodémographiques, données sociales et familiales, mode de vie...
- Données cliniques, symptomatologie, diagnostics, thérapeutiques, consommations de toxiques, passages à l'acte et facteurs de risques...
- Type de parcours (prédominance ambulatoire, hospitalière ou mixte), suivi avant 1^{ère} hospitalisation, perdu de vue après...

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES T2/T3


Notre échantillon se compose de 35 personnes (28 hommes; 7 femmes) âgées en moyenne de 22,49 ans (écart-type : 3,36) au moment de leur première hospitalisation. La durée moyenne de séjour est de 42,09 jours (écart-type : 81,89).

Lors de ce 1^{er} séjour, 27 sont diagnostiqués TSS, selon la CIM10, 6 hors TSS, et 2 non précisés. L'isolement social touche 48,6% de notre échantillon.


Dossiers 1^{er} séjours (=108)




Modes d'hospitalisation




Données Cliniques à l'entrée



Orientation à la sortie



Traitement à la sortie



DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES

Ces résultats préliminaires nous encouragent à poursuivre l'étude. Coldefy, Le Neindre et Nestrigue (2015) soulignent l'importance d'explorer ce champ, ils précisent que leurs « résultats gagneraient à être éclairés par des données plus qualitatives comme l'intensité clinique des troubles, les facteurs d'environnement et de soutien social, la qualité de l'engagement dans les soins et de satisfaction du patient » ⁽³⁾.

MOTS-CLÉS ET LIEN VERS POSTER



ACCÈS POSTER À SCANNER

Mots-clés

Troubles du spectre schizophrénique, première hospitalisation, psychose, parcours de soins

¹ Haute Autorité de Santé. ALD n°23 - Schizophrénies. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2007 Juin.

² Krebs, Marie-Odile. Signes précoces de schizophrénie. Des prodromes à la notion de prévention. Dunod, 2015

³ Coldefy M., Le Neindre C., Nestrigue C. Troubles schizophréniques et caractéristiques socio-économiques, géographiques et d'offre de soins des territoires. In : Des territoires fragmentés: enjeux psychiques et politiques, Rhizome, n°57, 2015/07, 6-7